

## الفصل الثاني عشر

### الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً

يعود سبب مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) إلى فيروس نقص المناعة البشرية الذي يضعف جهاز المناعة، ويجعل الجسم عرضة للأمراض الأخرى وغير قادر على أن يشفى منها.

ومرض الإيدز من الأوبئة المتفشية بين الدول، وتشير التقديرات الحالية لإجمالي عدد الإصابات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للإيدز إلى وجود 33 مليون إصابة تقريباً في عام 2007. ويقدر عدد الإصابات الجديدة بالإيدز بحوالي 2 مليون إصابة. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للإيدز إلى وفاة 2.8 مليون شخص جراء الإصابة بالإيدز (برنامج الأمم المتحدة للإيدز 2008).

تم تسجيل أول إصابة لمرض الإيدز في الأردن في عام 1986. ومع نهاية شهر كانون الأول عام 2007 بلغ عدد الحالات المبلغ عنها 550 إصابة، منها ما مجموعه 185 حالة بين السكان الأردنيين والباقي بين الوافدين (الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي USAID). وفي ظل عدم وجود أنظمة رقابة متطورة بشكل كامل في الأردن ووجود الخوف السائد من هذا المرض، والانطباع السيئ عن هذا المرض، فإن الإعتقاد بأن عدد حالات الإصابة بمرض الإيدز في الأردن يتجاوز عدد الإصابات المسجلة رسمياً (برنامج الإيدز الوطني 2008). وبناء على البيانات المتوافرة يمكن القول بأن انتقال هذا المرض يحدث بشكل رئيسي بين الأشخاص في الفئة العمرية 20-49 سنة، وبشكل أكبر من خلال ممارسة الجنس مع أكثر من شريك (60%)، ومن خلال الدم أو مشتقاته (17%)، وبين مستخدمي حقن المخدرات (3%)، ومن خلال نقل المرض من الأم إلى الطفل (2%) وأسباب غير معروفة (18%) (الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي USAID).

وفي عام 1986، أطلق الأردن برنامج الإيدز الوطني من خلال وزارة الصحة وبالتعاون مع الهيئات الدولية كبرنامج الأمم المتحدة للإيدز ومنظمة الصحة العالمية وذلك بهدف مكافحة هذا المرض في الأردن.

وتم جمع معلومات من خلال مسح السكان والصحة الأسرية 2007 من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج عن مرض الإيدز، بالإضافة إلى معلومات أخرى حول معرفتهن بأعراض الأمراض المنقولة جنسياً والتي تعرف بالعوامل المهمة لانتشار فيروس مرض الإيدز. ويلخص هذا الفصل معلومات حول معرفة وإدراك السيدات ممن أعمارهن 15-49 سنة وسبق لهن الزواج حسب الخصائص الأساسية.

#### 1.12 المعرفة بالإيدز ووسائل تجنبه

يبين الجدول 1.12 نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وسمعن بالإيدز حسب الخصائص الأساسية. وتشير البيانات إلى أن كافة السيدات المستجيبات تقريباً (99%) قد سمعن بالإيدز. وأن على الأقل 96% من السيدات حسب كافة الخصائص الأساسية قد سمعن بمرض الإيدز باستثناء السيدات غير المتعلّقات (86%).

جدول 1.12 نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة اللاتي سمعن بمرض الإيدز حسب الخصائص الأساسية، الأردن 2007		
عدد السيدات	سمعن بمرض الإيدز	الخصائص الأساسية
		<b>العمر</b>
1,512	98.7	24-15
236	97.6	19-15
1,276	98.9	24-20
1,977	98.8	29-25
4,265	99.3	39-30
3,122	97.7	49-40
		<b>الحالة الزوجية</b>
10,354	98.7	متزوجة
522	96.8	مطلقة/ أرملة
		<b>مكان الإقامة</b>
9,249	98.9	الحضر
1,627	97.2	الريف
		<b>المحافظات</b>
4,442	99.0	العاصمة
645	97.3	البلقاء
1,645	98.4	الزرقاء
262	97.2	مادبا
1,993	99.6	اربد
460	97.4	المفرق
293	99.3	جرش
228	98.7	عجلون
378	97.0	الكرك
146	98.0	الطفيلة
164	96.9	معان
221	96.6	العقبة
		<b>الإقليم</b>
6,993	98.6	الوسط
2,975	99.2	الشمال
908	97.0	الجنوب
		<b>منطقة البادية</b>
823	96.6	البادية
10,053	98.8	غير البادية
		<b>المستوى التعليمي الذي تم الالتحاق به</b>
416	86.3	غير متعلمة
813	96.9	ابتدائي
1,681	98.8	إعدادي
4,788	99.3	ثانوي
3,179	99.6	أعلى من الثانوي
		<b>شرائح الرفاه</b>
2,211	96.3	الأدنى
2,296	98.9	الثاني
2,206	99.0	الوسط
2,135	99.3	الرابع
2,028	100.0	الأعلى
<b>10,876</b>	<b>98.7</b>	<b>المجموع</b>

ولتقييم مستوى المعرفة بمرض الإيدز، تم سؤال المستجيبات اللاتي سمعن عنه حول ما يمكن للفرد أن يفعله لتجنب الإصابة بالفيروس الذي يسبب الإيدز. وإذا أجابت السيدة المستجيبة بأنه يمكن تجنب العدوى بالإيدز، فقد تم طرح نوعين من الأسئلة حول طرق الحماية من الإصابة بالإيدز. أولاً، طرح سؤال مفتوح يسمح للمستجيبات بذكر أية وسائل يعرفنها دون ذكر الخيارات. وبعد ذلك سئلن أسئلة محددة عما إذا كان استخدام الواقي الذكري، وممارسة الجنس مع شريك واحد أو الامتناع عن ممارسة الجنس يمكن أن يقلل فرص الإصابة بمرض الإيدز.

ويبين الجدول 2.12 نسبة السيدات اللاتي ذكرن بشكل تلقائي طرق محددة لتجنب الإصابة بمرض الايدز. وكانت أكثر الوسائل شيوعاً للوقاية من الإيدز هي تجنب نقل الدم (56%) واقتصار ممارسة الجنس مع شريك واحد فقط (38%). ويعتقد 27% من السيدات أن الامتناع عن ممارسة الجنس مع أشخاص يمارسون الجنس مع أكثر من شريك واحد يساعد في تجنب الإصابة بمرض الإيدز. كما أن 26% من السيدات ذكرن أن تجنب الحقن بالإبر يساعد في الوقاية من هذا المرض، في حين أن 1% فقط ذكرن بشكل تلقائي أن استخدام الواقي الذكري هو وسيلة لتجنب الايدز.

جدول 2.12 نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وذكرن بشكل تلقائي طرقاً لتجنب مرض الإيدز، الأردن 2007	
نسبة السيدات	طرق تجنب الإيدز
5.5	لم يسمعن بالمرض ولا يعرفن إن كان بالإمكان تجنبه
5.1	يعتقدن بأنه لا توجد طريقة لتجنب الإيدز
5.3	لا يعرفن طريقة محددة <sup>(1)</sup>
6.5	الامتناع عن ممارسة الجنس
1.2	استعمال الواقي الذكري
38.3	ممارسة الجنس مع عدد محدود من الشركاء
6.8	ممارسة الجنس مع الزوج فقط/ الزوجة فقط
14.1	تجنب معايشة المومسات
27.3	تجنب الجنس مع الأشخاص الذين يمارسون الجنس مع أكثر من شريك
11.3	تجنب ممارسة الجنس مع الشاذين جنسياً
9.7	تجنب الجنس مع الأشخاص الذين يحقنون أنفسهم بالمخدرات
55.9	تجنب نقل الدم
26.2	تجنب الحقن بالإبر
6.6	تجنب استعمال شفرات وأمواس الحلاقة المشتركة
1.4	تجنب التقبيل
0.1	تجنب لسعات البعوض
3.4	أخرى
<b>10,876</b>	<b>عدد السيدات</b>

(1): تعتقد السيدة أن هناك شيئاً يمكن عمله لتجنب الإيدز ولكن لم تذكر بشكل تلقائي أي طريقة محددة لذلك

وتركز برامج مكافحة الإيدز في رسائلها وجهودها على ثلاثة أوجه مهمة للسلوك، وهي تأخير ممارسة الجنس بين الفئات الشبابية (كالامتناع مثلاً)، والحد من ممارسة الجنس مع أكثر من شريك (الإخلاص لشريك واحد)، واستعمال الواقي الذكري (رسالة أ،ب،ج). وللتأكد فيما إذا كانت هذه البرامج التوعوية تعمل بفعالية لإيصال هذه الرسائل، فقد تمّ سؤال السيدات أسئلة محددة عمّا إذا كان من الممكن تقليل فرص الإصابة بمرض الإيدز من خلال فقط ممارسة الجنس مع شريك واحد مخلص، واستعمال الواقي الذكري عند ممارسة الجنس وعن طريق الامتناع عن ممارسة الجنس إطلاقاً. ويبين الجدول 3.12 استراتيجيات التجنب الثلاث حسب الخصائص الأساسية. وتجدر الإشارة إلى أن البيانات الواردة في هذا الجدول تستند إلى الأسئلة المستقصاة حول الأوجه الثلاثة للسلوك للوقاية من مرض الايدز، في حين أن البيانات الواردة في الجدول 2.12 تستند إلى الإجابات التلقائية للمستجيبات.

جدول 3.12 نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأجبن على أسئلة التقصي بأنه بالإمكان تقليل خطر الإصابة بفيروس مرض الإيدز باستعمال الواقي الذكري وقت المعاشرة الجنسية أو ممارسة الجنس مع شريك واحد غير مصاب بالإيدز وأن لا يكون لديه شركاء آخرون أو الامتناع عن ممارسة الجنس حسب الخصائص الأساسية، الأردن 2007					
نسبة الذين أجابوا بأن الإيدز يمكن الوقاية منه بي :					
عدد السيدات	الامتناع عن ممارسة الجنس	استعمال الواقي الذكري واقتصار ممارسة الجنس على شريك واحد غير مصاب	اقتصار ممارسة الجنس على شريك واحد غير مصاب <sup>(2)</sup>	استعمال الواقي الذكري <sup>(1)</sup>	الخصائص الأساسية
<b>العمر</b>					
1,512	36.9	48.4	85.0	51.0	24-15
236	33.5	42.7	80.2	44.5	19-15
1,276	37.5	49.4	85.8	52.2	24-20
1,977	43.8	52.2	86.6	55.2	29-25
4,265	44.0	50.7	86.5	54.3	39-30
3,122	45.1	48.8	86.0	51.5	49-40
<b>الحالة الزوجية</b>					
10,354	43.3	50.6	86.5	53.7	متزوجة
522	42.6	40.2	79.5	43.3	مطلقة/ أرملة
<b>مكان الإقامة</b>					
9,249	43.6	50.9	86.6	53.9	الحضر
1,627	41.2	45.7	83.5	49.2	الريف
<b>المحافظات</b>					
4,442	47.3	53.8	89.9	55.9	العاصمة
645	40.7	49.3	85.8	52.0	البلقاء
1,645	40.7	40.7	74.5	44.8	الزرقاء
262	36.2	39.3	84.1	43.7	مادبا
1,993	39.6	54.0	90.1	57.6	اريد
460	40.3	52.1	88.0	54.5	المفرق
293	37.3	47.2	90.7	48.9	جرش
228	36.3	54.3	93.8	56.3	عجلون
378	45.0	43.9	80.0	51.0	الكرك
146	48.6	41.9	77.0	48.8	الطفيلة
164	45.7	42.1	76.0	48.3	معان
221	44.6	42.5	71.6	47.4	العقبة
<b>الإقليم</b>					
6,993	44.7	49.7	85.7	52.5	الوسط
2,975	39.2	53.1	90.1	56.1	الشمال
908	45.6	42.9	76.8	49.3	الجنوب
<b>منطقة البادية</b>					
823	39.6	44.4	82.2	47.0	البادية
10,053	43.6	50.5	86.5	53.7	غير البادية
<b>المستوى التعليمي الذي تم الالتحاق به</b>					
416	35.7	26.2	61.5	28.2	غير متعلمة
813	39.2	40.2	79.1	43.1	ابتدائي
1,681	42.0	45.9	86.9	47.7	إعدادي
4,788	44.1	50.2	86.7	53.6	ثانوي
3,179	44.7	57.8	89.9	61.3	أعلى من الثانوي
<b>شرائح الرفاه</b>					
2,211	37.4	42.0	80.4	44.5	الأدنى
2,296	43.5	47.8	84.6	50.8	الثاني
2,206	44.0	49.2	84.5	52.8	الوسط
2,135	42.0	52.0	89.3	56.0	الرابع
2,028	50.0	60.4	92.6	62.8	الأعلى
<b>10,876</b>	<b>43.3</b>	<b>50.1</b>	<b>86.2</b>	<b>53.2</b>	<b>المجموع</b>

(1) استعمال الواقي الذكري عند ممارسة الجنس

(2) الشريك الذي ليس له شركاء آخرين.

وقد كانت السيدات اللاتي سبق لهن الزواج الأكثر معرفه باقتصار المعاشرة الجنسية على شريك واحد غير مصاب بهذا المرض (86%). كما أن هناك القليل من السيدات يعرفن بأن استعمال الواقي الذكري أو الامتناع عن المعاشرة الجنسية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض الإيدز (53% و43% على التوالي). كما أنه ليس من المستغرب أن المعرفة بوسائل الوقاية من الإيدز هي الأعلى بين السيدات اللاتي يُقمن في المناطق الحضرية، والسيدات الأعلى تعليماً والسيدات اللاتي يعشن في أسر ضمن شرائح

الرفاه الأعلى. وهناك علاقة قوية بشكل خاص بين التعليم والمعرفة باستعمال الواقي الذكري كوسيلة للوقاية من مرض الايدز. وتبين أن 28% من السيدات الأميات يستعملن الواقي الذكري كوسيلة للوقاية من مرض الإيدز مقارنة مع 61% من السيدات اللاتي تعلمهن أعلى من الثانوي.

وتضمّن مسح السكان والصحة الأسرية 2007 أسئلة لتقييم مدى انتشار المفاهيم الخاطئة حول مرض الايدز وانتقال فيروس مرض الايدز، فقد تم سؤال المستجيبات اللاتي سمعن عن مرض الإيدز أو الفيروس المسبب له عدداً من الأسئلة حول معرفتهن بالقضايا المتعلقة بهذا المرض، حيث سئلت السيدات عما إذا كن يعتقدن بأن يكون الشخص ذو المظهر الصحي مصاباً بالايديز. وكذلك حول إمكانية إصابة الشخص بهذا المرض عن طريق لسعة البعوض أو مصافحة شخص آخر مصاب بالإيدز، أو مشاركة الطعام مع شخص مصاب بالمرض. وتشير النتائج في الجدول 4.12 إلى أن الكثير من السيدات الأردنيات يفتقرن المعرفة الدقيقة بطرق انتقال مرض الايدز. إذ أن 66% فقط من السيدات يعرفن بإمكانية أن يكون الشخص ذو المظهر الصحي مصاباً بالإيدز وبالتالي أن ينقل الفيروس المسبب له. ويشكل هذا زيادة جوهرية عن 2002، حيث أن 46% من السيدات أفدن فقط أنهن يعرفن ذلك.

ويعتقد الكثير من السيدات بأن الإيدز يمكن أن ينتقل عن طريق لسعات البعوض. في حين يرفض ما نسبته 40% فقط من النساء هذا المفهوم الخاطئ والشائع. وتدرّك نسبة كبيرة من السيدات بأن فيروس مرض الإيدز لا يمكن أن ينتقل عن طريق المشاركة في تناول الطعام مع شخص مصاب بالإيدز (73%)، أو عن طريق المصافحة مع شخص يعاني من هذا المرض (79%). وعلى أية حال فإن ربع السيدات فقط (24%) يرفضن المفهومين الخاطئين الأكثر شيوعاً وهما: أن الإيدز يمكن أن ينتقل عن طريق لسعات البعوض أو أن الشخص يمكن أن يُصاب بالإيدز عن طريق مشاركة الطعام مع شخص آخر مصاب أو المعرفة بإمكانية أن يكون الشخص ذو المظهر الصحي مصاباً بالايديز.

كما يبين الجدول 4.12 تقييماً لمستوى المعرفة الشاملة بكيفية الوقاية من مرض الإيدز وانتقاله. وتُعرّف المعرفة الشاملة بأنها: (1) المعرفة بأن كل من استعمال الواقي الذكري واقتصار المعاشرة الجنسية على شريك واحد خالٍ من مرض الإيدز هي من طرق الوقاية من هذا الايدز (2) والإدراك بأن يكون الشخص ذو المظهر الصحي مصاباً بالإيدز (3) رفض المفهومين الخاطئين الأكثر شيوعاً من أن الإيدز يمكن أن ينتقل عن طريق لسعات البعوض أو مشاركة الشخص المصاب بالإيدز تناول الطعام. وبشكل عام، فإن 14% فقط من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج لديهن معرفة شاملة بكيفية الوقاية من مرض الإيدز وطرق انتقاله إلى الشخص غير المصاب. وترتبط المعرفة الشاملة بشكل طردي مع التعليم، حيث أن 22% من السيدات الأعلى تعليماً لديهن معرفه شامله بالإيدز مقابل 3% من السيدات غير المتعلّقات.

وسئلت المستجيبات من خلال مسح السكان والصحة الأسرية 2007 حول معرفتهن بإمكانية انتقال فيروس مرض الإيدز من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو أثناء الولادة أو أثناء الرضاعة الطبيعية (الجدول 12.5).

جدول 4.12 نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأفدن بأن الشخص ذو المظهر الصحي يمكن أن يكون مصاباً بفيروس الإيدز اللاتي اجبن عن أسئلة التقصي، ويرفضن سوء الفهم حول تقبل المرض أو الوقاية منه بشكل صحيح ونسبة اللاتي على معرفة شاملة بمرض الإيدز حسب الخصائص الأساسية، الأردن 2007

عدد السيدات	نسبة المعرفة الشاملة بالإيدز	نسبة اللاتي أفدن أن الشخص ذو المظهر الصحي يمكن أن يكون مصاباً ويرفضن المفهومين الخاطئين الأكثر شيوعاً	نسبة السيدات اللاتي قلن بأن			الشخص ذو المظهر الصحي يمكن أن يكون مصاباً بالإيدز	الخصائص الأساسية
			لا يمكن للشخص أن يصاب بمشاركة الطعام مع شخص آخر مصاب	لا يمكن للإيدز أن ينتقل بالمصافحة	لا يمكن للإيدز أن ينتقل بواسطة لسعات البعوض		
							<b>العمر</b>
1,512	12.9	23.0	71.4	80.2	41.6	64.0	24-15
236	12.3	17.4	67.6	79.2	33.9	56.3	19-15
1,276	13.0	24.0	72.2	80.4	43.1	65.4	24-20
1,977	14.1	22.2	70.9	81.1	38.9	63.5	29-25
4,265	14.9	25.6	75.4	80.7	41.5	68.1	39-30
3,122	14.6	23.5	71.9	76.2	37.9	64.3	49-40
							<b>الحالة الزوجية</b>
10,354	14.6	24.2	73.3	79.8	40.0	65.9	متزوجة
522	10.5	21.4	67.7	72.7	39.4	59.9	مطلقة/ ارملة
							<b>مكان الإقامة</b>
9,249	14.8	24.6	74.4	80.6	40.9	66.1	الحضر
1,627	12.0	21.0	65.3	72.5	34.8	62.4	الريف
							<b>المحافظات</b>
4,442	16.3	27.0	78.8	84.7	42.2	70.3	العاصمة
645	14.4	22.8	67.0	71.9	32.1	69.7	البلقاء
1,645	11.8	22.0	72.8	75.3	49.0	56.2	الزرقاء
262	12.8	34.4	69.8	75.2	48.1	66.5	مادبا
1,993	15.2	22.3	69.2	79.7	36.4	62.8	اريد
460	11.2	17.2	60.9	72.7	29.6	57.6	المفرق
293	11.9	21.2	73.1	79.1	34.2	67.8	جرش
228	12.8	20.4	67.7	76.1	30.5	66.5	عجلون
378	11.7	20.6	65.9	72.6	33.4	67.1	الكرك
146	8.7	16.8	64.1	70.0	31.3	64.0	الطفيلة
164	8.9	17.9	61.1	65.9	31.6	63.3	معان
221	13.0	22.5	71.8	72.9	35.7	65.2	العقبة
							<b>الإقليم</b>
6,993	14.9	25.7	76.0	81.0	43.1	66.8	الوسط
2,975	14.1	21.3	68.2	78.3	34.7	62.8	الشمال
908	11.1	20.0	66.2	71.1	33.3	65.5	الجنوب
							<b>منطقة البادية</b>
823	8.5	18.5	62.5	70.0	33.2	56.8	البادية
10,053	14.9	24.5	73.9	80.2	40.6	66.3	غير البادية
							<b>المستوى التعليمي الذي تم الالتحاق به</b>
416	3.4	9.5	39.5	40.6	21.1	42.8	غير متعلمة
813	8.5	13.6	55.4	62.6	28.5	48.0	ابتدائي
1,681	9.8	17.9	67.2	73.9	37.4	55.4	إعدادي
4,788	12.9	22.3	74.9	81.4	39.9	65.1	ثانوي
3,179	21.9	34.4	82.1	88.7	46.9	79.2	أعلى من الثانوي
							<b>شرائح الرفاه</b>
2,211	10.0	17.6	60.4	67.7	34.5	55.7	الأدنى
2,296	12.3	22.1	70.2	77.9	40.9	61.6	الثاني
2,206	12.6	22.5	71.6	78.9	37.5	64.9	الوسط
2,135	15.1	26.1	78.7	84.4	42.5	69.2	الرابع
2,028	22.7	32.7	85.5	89.2	45.1	77.8	الأعلى
<b>10,876</b>	<b>14.4</b>	<b>24.0</b>	<b>73.0</b>	<b>79.4</b>	<b>40.0</b>	<b>65.6</b>	<b>المجموع</b>

(1) هناك سوء فهم شائع لموضوعين: لسعة البعوض، ومشاركة الطعام.  
(2) المعرفة الشاملة تعني المعرفة بأن الاستعمال المسبق للواقي الذكري خلال المعاشرة الجنسية وان يكون الشخص لديه شريك مخلص غير مصاب؛ يمكن أن يقلل فرصة الإصابة بفيروس مرض الإيدز، والمعرفة بأن الشخص الذي يبدو بمظهر صحي يمكن أن يصاب بفيروس مرض الإيدز ورفض سؤ الفهم الشائع حول نقل المرض والوقاية منه.

جدول 5.12 نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج ويعرفن بانتقال مرض الإيدز إلى الطفل من الأم حسب الخصائص الأساسية، الأردن 2007				
عدد السيدات	نسبة اللاتي يقلن أن الإيدز يمكن أن ينتقل من الأم إلى الطفل أثناء			الخصائص الأساسية
	خلال الرضاعة الطبيعية	الحمل	الولادة	
				<b>العمر</b>
1,512	61.3	87.6	70.5	24-15
236	69.4	88.9	65.2	19-15
1,276	59.8	87.4	71.5	24-20
1,977	50.5	85.5	74.3	29-25
4,265	50.1	85.4	74.4	39-30
3,122	48.5	85.8	75.3	49-40
				<b>الحالة الزوجية</b>
10,354	51.1	85.9	74.3	متزوجة
522	55.0	85.2	70.6	مطلقة/ الرملة
				<b>حالة الحمل</b>
1,315	49.9	83.6	70.5	حامل
9,561	51.5	86.2	74.6	غير حامل لو غير متأكدة
				<b>مكان الإقامة</b>
9,249	50.6	86.4	74.6	الحضر
1,627	55.3	82.5	71.3	الريف
				<b>المحافظات</b>
4,442	47.6	87.4	73.9	العاصمة
645	51.9	78.4	72.7	البلقاء
1,645	49.6	86.1	78.3	الزرقاء
262	58.3	80.9	74.1	مادبا
1,993	57.5	85.8	74.0	اريد
460	59.3	85.4	72.0	المفرق
293	62.9	88.0	77.9	جرش
228	58.1	86.3	73.4	عجلون
378	51.8	85.1	73.7	الكرك
146	45.8	84.0	68.1	الطفيلة
164	48.5	83.3	65.0	معان
221	38.1	83.3	65.6	العقبة
				<b>الإقليم</b>
6,993	48.8	86.0	74.8	الوسط
2,975	58.4	86.0	74.0	الشمال
908	46.9	84.1	69.3	الجنوب
				<b>منطقة البادية</b>
823	56.3	82.0	70.0	البادية
10,053	50.9	86.2	74.4	غير البادية
				<b>المستوى التعليمي الذي تم الالتحاق به</b>
416	46.2	61.9	51.3	غير متعلمة
813	55.4	74.7	65.2	ابتدائي
1,681	54.5	86.3	72.7	إعدادي
4,788	51.6	86.7	72.3	ثانوي
3,179	48.7	90.3	82.8	أعلى من الثانوي
				<b>شرائح الرفاه</b>
2,211	58.2	80.5	66.7	الأدنى
2,296	54.1	84.2	72.7	الثاني
2,206	51.9	88.0	73.8	الوسط
2,135	48.0	88.7	77.9	الرابع
2,028	43.3	88.2	80.2	الأعلى
<b>10,876</b>	<b>51.3</b>	<b>85.9</b>	<b>74.1</b>	<b>المجموع</b>

وتشير النتائج إلى أنه بينما 86% من السيدات يعرفن أن الإيدز يمكن أن ينتقل من الأم إلى الطفل أثناء الحمل، وثلاثة أرباع (74%) السيدات يعرفن أن فيروس مرض الإيدز يمكن أن ينتقل أثناء الولادة، فإن النصف فقط يعرفن بأنه يمكن أن ينتقل من خلال الرضاعة الطبيعية (51%). وبالرغم من أن معرفة انتقال مرض الإيدز أثناء الحمل وأثناء الولادة يرتبطان بشكل طردي مع تعليم المرأة، فإنه لا توجد علاقة بين المستويات التعليمية للسيدات والمعرفة بانتقال فيروس مرض الإيدز عن طريق الرضاعة الطبيعية.

## 2.12 الجوانب الاجتماعية للإيدز

تشمل الجوانب الاجتماعية للإيدز على مواقف سلبية نحو أناس يتعايشون مع هذا المرض. فالانطباع السائد لدى المجتمع عن هذا المرض هو ارتباطه بفئات مهمشة كذلك التي تتعاطى المخدرات عن طريق استخدام الحقن والمومسات واللواطيين. فتخوف الشخص من أن يتسم بهذه الوصمة السيئة قد شكل عائقاً أمام إجراء الفحوصات المتعلقة بالإيدز والبرامج الهادفة إلى مساعدة المصابين للتعايش مع هذا المرض أو مع عائلاتهم.

جدول 6.12 نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة اللاتي أجبن إجابات محددة عن الأسئلة الخاصة بالأوجه الاجتماعية للإيدز حسب الخصائص الأساسية، الأردن 2007						
عدد السيدات اللاتي سمعن بالإيدز	تقبل كافة مؤشرات التسامح الأربعة	نسبة السيدات اللاتي:				الخصائص الأساسية
		لا يخفين حقيقة أن أحد أفراد الأسرة مصاب بالإيدز	قلن بأنه يمكن للمعلمة المصابة بمرض الإيدز أن تدرس	يرغبن بشراء الخضراوات الطازجة من بقاله صاحبها مصاب بالإيدز	يرغبن بالعاية بالأقارب المصابين بهذا المرض في بيوتهن	
						<b>العمر</b>
1,492	4.8	33.5	29.0	25.8	73.1	24-15
230	4.8	36.1	27.2	29.3	61.5	19-15
1,262	4.8	33.0	29.3	25.1	75.2	24-20
1,953	4.1	35.9	25.5	23.0	73.3	29-25
4,233	4.6	34.7	30.7	25.8	74.7	39-30
3,050	2.9	36.0	28.0	22.1	74.7	49-40
						<b>الحالة الزوجية</b>
10,224	4.2	35.1	28.8	24.4	74.0	متزوجة
505	2.1	34.9	28.0	21.8	78.9	مطلقة/ أرملة
						<b>مكان الإقامة</b>
9,148	4.1	34.6	29.4	24.6	73.3	الحضر
1,582	3.6	38.4	25.2	22.4	79.6	الريف
						<b>المحافظات</b>
4,397	4.8	31.0	33.7	27.6	72.9	العاصمة
627	1.9	27.0	29.3	24.6	60.6	البلقاء
1,618	2.5	33.3	23.6	24.4	60.6	الزرقاء
254	1.8	28.5	28.2	28.3	81.0	مادبا
1,986	3.7	38.0	23.5	18.1	81.5	اربد
448	3.0	38.6	24.0	19.6	82.9	المفرق
291	3.1	41.9	28.4	24.3	76.1	جرش
225	4.6	45.8	27.6	18.8	82.2	عجلون
367	6.6	51.3	29.2	24.3	90.2	الكرك
143	6.1	53.9	26.1	22.2	90.3	الطفيلة
158	5.9	53.0	25.4	22.2	89.8	معان
214	7.7	56.3	28.3	23.5	91.2	العقبة
						<b>الإقليم</b>
6,897	3.9	31.1	30.7	26.6	69.2	الوسط
2,951	3.6	39.1	24.4	19.0	81.2	الشمال
882	6.6	53.2	27.8	23.4	90.4	الجنوب
						<b>منطقة البادية</b>
795	3.4	38.6	25.1	23.8	81.6	البادية
9,934	4.1	34.8	29.0	24.3	73.6	غير البادية
						<b>المستوى التعليمي الذي تم الالتحاق به</b>
359	1.2	47.6	14.1	16.9	78.0	غير متعلمة
787	2.5	39.3	19.8	17.6	77.5	ابتدائي
1,660	3.3	37.8	26.9	23.3	71.4	إعدادي
4,756	4.1	34.0	28.8	25.3	74.0	ثانوي
3,167	5.1	32.9	33.5	25.7	74.8	أعلى من الثانوي
						<b>شرائح الرفاه</b>
2,128	3.6	36.6	22.6	21.1	74.9	الأدنى
2,271	4.1	36.1	27.2	22.9	74.8	الثاني
2,183	3.2	36.1	27.0	22.8	75.5	الوسط
2,120	4.7	34.6	30.0	28.0	72.8	الرابع
2,028	4.7	31.9	37.5	26.8	73.0	الأعلى
<b>10,729</b>	<b>4.1</b>	<b>35.1</b>	<b>28.7</b>	<b>24.3</b>	<b>74.2</b>	<b>المجموع</b>

وسئلت السيدات في مسح السكان والصحة الأسرية 2007 اللاتي سمعن بمرض الإيدز عدة أسئلة لتقييم مدى ارتباط وصمة العار بهذا المرض. وتشير النتائج في الجدول 6.12 إلى أن ثلاثة أرباع السيدات يرغبن بالعاية بالأقارب المصابين بهذا المرض في بيوتهن (74%)، إلا أن أقل من ذلك بكثير يرغبن بشراء الخضراوات الطازجة من بقاله صاحبها بالإيدز (24%) أو السماح لمعلمه مصابة بمرض



الإيدز الاستمرار في التدريس (29%)، كما أن حوالي ثلث السيدات ذكرن بأنهن لا يتكتمن على حقيقة أن أحد أفراد الأسرة مصاب بالإيدز. في حين أعرب 4% فقط من السيدات عن تقبلهن لكافة مؤشرات التسامح الأربعة المشار إليها أعلاه مما يشير إلى أن وصمة العار المرتبطة بالإيدز منتشرة في الأردن.

### 3.12 الاتجاهات نحو مناقشة العلاقات الجنسية الآمنة

إن المعرفة بطرق انتقال مرض الإيدز وكيفية الوقاية منه ليست ذات فائدة كبيرة إذا شعر الناس أنهم عاجزون عن مناقشة الممارسات الجنسية الآمنة مع أقرانهم. ولمعرفة مقدرة السيدات على مناقشة الممارسات الجنسية الآمنة مع أقرانهم المصابين بأمراض متفولة جنسياً، فقد سئلت السيدات عما إذا كن يعتقدن بأن الزوجة لها الحق في رفض ممارسة الجنس مع زوجها عند معرفتها بأن زوجها يعاني من مرض يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وفيما إذا كان للمرأة الحق في الطلب إلى زوجها باستعمال الواقي الذكري في نفس الظروف.

ويبين الجدول 7.12 أن كافة السيدات تقريباً يعتقدن بأن الزوجة إذا عرفت بأن زوجها يعاني من الأمراض المنقولة جنسياً فإن لها الحق إما أن ترفض المعاشرة الجنسية معه أو الطلب إليه استعمال الواقي الذكري (99%). وإذا ما أخذنا كلا الاجرائين كل على حده، فإن الغالبية العظمى من السيدات يعتقدن بأن السيدة لها الحق في رفض المعاشرة الجنسية مع زوجها (97%) أو الطلب إليه استعمال الواقي الذكري (89%).

وسئلت السيدات المتزوجات حالياً فيما إذا سبق أن ناقشن مع أزواجهن طرق تجنب الإصابة بالإيدز، كون أن مثل هذا النقاش بين الشريكين هو من الأمور المهمة في السلوك الوقائي. ويبين الجدول 8.12 أن حوالي ثلث السيدات المتزوجات حالياً (36%) ناقشن ذلك مع أزواجهن، في حين لم يناقش الثلثين (62%) ذلك مع أزواجهن. وأتضح مره أخرى أن السيدات الأصغر سناً واللاتي يقمن في الريف والسيدات الأقل تعليماً واللاتي يعشن في أسر فقيرة كن أقل ميلاً للتحدث مع أقرانهم حول هذه القضية المهمة. بينما كانت السيدات اللاتي حصلن على تعليم أعلى من الثانوي (45%) والسيدات اللاتي يعشن ضمن شريحة الأسر الأكثر رفاهاً (45%) والسيدات اللاتي يقمن في محافظة الزرقاء (41%) أكثر ميلاً لمناقشة أزواجهن بطرق تجنب الإصابة بالإيدز.

جدول 7.12 نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج ويعتقدن انه إذا كان الزوج مصاباً بأحد الأمراض المنقولة جنسياً فإن للزوجة الحق في رفض المعاشرة الجنسية معه أو أن تطلب منه استعمال الواقي الذكري حسب الخصائص الأساسية، الأردن 2007				
الخصائص الأساسية	يحق للزوجة رفض ممارسة الجنس أو استخدام الواقي الذكري	استخدام الواقي الذكري	يحق للزوجة رفض ممارسة الجنس	عدد السيدات
<b>العمر</b>				
24-15	97.6	87.5	96.1	1,512
19-15	94.1	83.4	92.1	236
24-20	98.2	88.3	96.9	1,276
29-25	99.4	91.9	99.1	1,977
39-30	98.7	90.2	96.9	4,265
49-40	98.3	87.7	96.6	3,122
<b>الحالة الزوجية</b>				
متزوجة	98.6	89.6	97.2	10,354
مطلقة/ أرملة	96.9	84.7	95.6	522
<b>مكان الإقامة</b>				
الحضر	98.7	89.7	97.3	9,249
الريف	97.8	87.6	96.4	1,627
<b>المحافظات</b>				
العاصمة	98.2	87.9	96.2	4,442
البلقاء	98.3	91.1	98.0	645
الزرقاء	99.1	92.5	98.4	1,645
مادبا	98.5	92.2	97.4	262
اريد	99.2	90.8	98.6	1,993
المفرق	99.2	90.4	97.7	460
جرش	99.1	94.6	98.4	293
عجلون	99.1	93.2	97.8	228
الكرك	95.2	80.8	92.0	378
الطفيلة	98.4	85.9	95.9	146
معان	98.1	84.7	96.0	164
العقبة	98.7	83.3	97.5	221
<b>الإقليم</b>				
الوسط	98.5	89.4	96.9	6,993
الشمال	99.2	91.3	98.4	2,975
الجنوب	97.1	83.0	94.7	908
<b>منطقة البادية</b>				
البادية	97.5	85.9	96.4	823
غير البادية	98.6	89.7	97.2	10,053
<b>المستوى التعليمي الذي تم الالتحاق به</b>				
غير متعلمة	92.3	77.2	89.3	416
ابتدائي	96.6	84.8	93.0	813
إعدادي	98.7	87.5	97.3	1,681
ثانوي	98.8	89.5	97.5	4,788
أعلى من الثانوي	99.4	93.1	98.6	3,179
<b>شرائح الرفاه</b>				
الأدنى	97.7	87.4	95.4	2,211
الثاني	99.1	89.6	97.1	2,296
الوسط	97.8	89.1	96.7	2,206
الرابع	98.8	89.8	98.2	2,135
الأعلى	99.4	91.4	98.4	2,028
<b>المجموع</b>	<b>98.6</b>	<b>89.4</b>	<b>97.1</b>	<b>10,876</b>

جدول 8.12 التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً حسب إذا ما ناقشن الوقاية من الإيدز مع أزواجهن حسب الخصائص الأساسية، الأردن 2007					
الخصائص الأساسية	ناقشن مع أزواجهن طرق تجنب الإصابة بالإيدز	لم يناقشن مع أزواجهن طرق تجنب الإصابة بالإيدز	لم يسمعن بالإيدز	المجموع	عدد السيدات
<b>العمر</b>					
24-15	28.8	69.9	1.4	100.0	1,466
19-15	22.5	75.0	2.5	100.0	233
24-20	29.9	68.9	1.2	100.0	1,233
29-25	35.5	63.3	1.2	100.0	1,932
39-30	38.7	60.6	0.7	100.0	4,095
49-40	37.5	60.5	2.0	100.0	2,861
<b>مكان الإقامة</b>					
الحضر	37.0	62.0	1.0	100.0	8,803
الريف	32.7	64.6	2.8	100.0	1,551
<b>المحافظات</b>					
العاصمة	35.7	63.4	0.8	100.0	4,242
البلقاء	36.9	60.4	2.7	100.0	620
الزرقاء	40.9	57.5	1.6	100.0	1,548
مادبا	28.1	69.2	2.6	100.0	248
اربد	37.2	62.6	0.3	100.0	1,892
المفرق	33.1	64.1	2.8	100.0	441
جرش	28.5	70.9	0.6	100.0	278
عجلون	35.4	63.3	1.3	100.0	218
الكرك	38.2	58.8	3.0	100.0	363
الطفيلة	32.0	66.3	1.8	100.0	139
معان	36.3	60.6	3.1	100.0	154
العقبة	33.2	63.5	3.3	100.0	212
<b>الإقليم</b>					
الوسط	36.8	62.0	1.3	100.0	6,658
الشمال	35.6	63.7	0.8	100.0	2,830
الجنوب	35.7	61.5	2.9	100.0	867
<b>منطقة البادية</b>					
البادية	29.7	66.8	3.5	100.0	783
غير البادية	36.9	62.0	1.1	100.0	9,571
<b>المستوى التعليمي الذي تم الالتحاق به</b>					
غير متعلمة	14.4	72.2	13.4	100.0	365
ابتدائي	25.1	72.1	2.8	100.0	734
إعدادي	30.5	68.4	1.1	100.0	1,581
ثانوي	36.0	63.3	0.7	100.0	4,586
أعلى من الثانوي	45.0	54.6	0.4	100.0	3,089
<b>شرائح الرفاه</b>					
الأدنى	27.2	69.3	3.5	100.0	2,083
الثاني	34.2	64.6	1.1	100.0	2,184
الوسط	35.9	63.2	0.9	100.0	2,104
الرابع	40.4	58.9	0.7	100.0	2,018
الأعلى	44.6	55.3	0.0	100.0	1,966
<b>المجموع</b>	<b>36.3</b>	<b>62.4</b>	<b>1.3</b>	<b>100.0</b>	<b>10,354</b>

#### 4.12 المعرفة بأعراض الأمراض المنقولة جنسياً

إن الأمراض المنقولة جنسياً هي عوامل تهيئة مهمة لنقل الفيروس المسبب للإيدز. وبشكل عام، فإن وجود الأمراض المنقولة جنسياً في مجتمع ما يزيد من احتمالية حدوث مرض الإيدز. لذا يجب أن تركز برامج الوقاية من الإيدز على الوقاية من هذه الأمراض ومعالجتها على حد سواء. وقد تم تضمين مسح السكان والصحة الأسرية 2007 أسئلة إضافية لتقييم مستوى الوعي بالأمراض المنقولة جنسياً ومعرفة أعراض هذه الأمراض بين كل من الرجال والنساء.

ويبين الجدول 9.12 أن 69% من السيدات ليس لديهن معرفة بالأمراض المنقولة جنسياً عدا الإيدز. وكما هو متوقع كانت السيدات الأصغر سناً واللاتي يقمن في المناطق الريفية وذوات المستويات التعليمية الدنيا والسيدات اللاتي في شرائح الرفاه الأدنى أقل معرفة من غيرهن بالأمراض المنقولة جنسياً. كما أن 17% فقط من السيدات استطعن على الأقل معرفة أحد أعراض الأمراض المنقولة جنسياً بين الرجال، وكانت

هذه النسبة مماثلة بين السيدات اللاتي استطعن على الأقل معرفة أحد الأمراض المنقولة جنسياً بين السيدات.

جدول 9.12 التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج حسب المعرفة بالأعراض التي لها علاقة بالأمراض المنقولة جنسياً من الرجال ومن النساء حسب الخصائص الأساسية، الأردن 2007								
عدد السيدات	المعرفة بأعراض الأمراض المنقولة جنسياً للسيدات			المعرفة بأعراض الأمراض المنقولة جنسياً للرجال			لم يسمع عن الأمراض المنقولة جنسياً (غير الايدز)	الخصائص الأساسية
	ذكر اثنين أو أكثر من أعراض المرض	ذكر نوع واحد من أعراض المرض	لم يذكر أي من أعراض المرض	ذكر اثنين أو أكثر من أعراض المرض	ذكر نوع واحد من أعراض المرض	لم يذكر أي من أعراض المرض		
								<b>العمر</b>
1,512	7.1	4.1	10.9	7.4	3.7	11.0	77.9	24-15
236	3.9	5.9	7.7	3.9	4.3	9.2	82.6	19-15
1,276	7.7	3.8	11.5	8.1	3.6	11.3	77.0	24-20
1,977	11.1	3.6	13.7	10.4	4.8	13.2	71.7	29-25
4,265	15.6	3.3	14.8	14.6	4.2	15.0	66.2	39-30
3,122	13.4	4.6	14.8	12.6	5.3	15.0	67.1	49-40
								<b>الحالة الزوجية</b>
10,354	13.1	3.9	14.2	12.4	4.5	14.2	68.9	متزوجة
522	10.9	3.1	12.3	9.8	5.3	11.2	73.7	مطلقة/ أرملة
								<b>مكان الإقامة</b>
9,249	13.7	3.9	14.6	12.9	4.7	14.6	67.8	الحضر
1,627	9.1	3.4	11.3	8.8	3.7	11.2	76.2	الريف
								<b>المحافظات</b>
4,442	16.4	4.1	19.3	15.2	5.3	19.3	60.2	العاصمة
645	15.1	4.2	9.0	14.0	4.5	9.8	71.7	البلقاء
1,645	13.1	2.2	10.7	12.4	2.6	11.1	73.9	الزرقاء
262	8.2	3.9	27.2	8.3	4.0	27.1	60.7	مادبا
1,993	8.9	4.7	8.8	8.5	5.3	8.7	77.5	اربد
460	6.7	2.8	7.8	7.0	2.9	7.4	82.8	المفرق
293	9.0	3.1	13.3	9.3	3.2	13.0	74.6	جرش
228	7.8	3.5	7.3	7.2	4.6	6.9	81.3	عجلون
378	12.9	4.7	12.5	14.0	4.7	11.3	69.9	الكرك
146	10.5	4.2	9.1	10.0	4.9	8.9	76.2	الطفيلة
164	7.7	3.0	8.9	7.4	2.9	9.3	80.3	معان
221	9.9	3.7	10.5	9.7	3.5	10.9	75.9	العقبة
								<b>الأقليم</b>
6,993	15.2	3.7	16.7	14.1	4.6	16.8	64.5	الوسط
2,975	8.5	4.2	9.0	8.2	4.6	8.8	78.3	الشمال
908	10.8	4.1	10.8	11.1	4.1	10.5	74.3	الجنوب
								<b>منطقة البادية</b>
823	6.1	2.5	14.5	6.6	2.6	13.9	76.9	البادية
10,053	13.6	4.0	14.0	12.7	4.7	14.1	68.5	غير البادية
								<b>المستوى التعليمي الذي تم الالتحاق به</b>
416	1.5	0.5	5.9	1.5	0.9	5.5	92.1	غير متعلمة
813	2.8	1.6	5.7	3.1	1.3	5.7	89.9	ابتدائي
1,681	4.6	0.8	8.1	4.1	2.4	7.0	86.4	إعدادي
4,788	10.4	3.5	12.7	9.7	3.4	13.5	73.4	ثانوي
3,179	25.4	7.0	22.4	24.2	8.7	22.0	45.2	أعلى من الثانوي
								<b>شرائح الرفاه</b>
2,211	4.6	1.6	8.9	5.0	1.7	8.5	84.8	الأدنى
2,296	9.1	3.7	11.7	9.1	4.2	11.2	75.5	الثاني
2,206	12.7	3.6	12.1	10.8	5.0	12.6	71.6	الوسط
2,135	15.0	4.7	16.5	14.1	5.7	16.5	63.8	الرابع
2,028	24.7	5.7	22.0	23.5	6.5	22.5	47.5	الأعلى
<b>10,876</b>	<b>13.0</b>	<b>3.8</b>	<b>14.1</b>	<b>12.3</b>	<b>4.5</b>	<b>14.1</b>	<b>69.1</b>	<b>المجموع</b>

## 5.12 المعرفة بالواقى الذكري واستعماله

تشير البيانات الواردة في الفصل الخامس أن 89% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج يعرفن الواقى الذكري. ولأهمية الدور الذي يلعبه الواقى الذكري في مكافحة انتقال فيروس الايدز، فقد سنلت المستجيبات حول معرفتهن بمصادر الحصول عليه.

جدول 10.12 نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج ويعرفن مصدر للحصول على الواقي الذكري حسب الخصائص الأساسية، الأردن 2007		
عدد السيدات	تعرف مصدر للحصول على الواقي الذكري	الخصائص الأساسية
		<b>العمر</b>
1,512	69.1	24-15
236	45.7	19-15
1,276	73.4	24-20
1,977	77.9	29-25
4,265	79.0	39-30
3,122	69.6	49-40
		<b>الحالة الزوجية</b>
10,354	75.6	متزوجة
522	57.1	مطلقة/ أرملة
		<b>مكان الإقامة</b>
9,249	75.6	الحضر
1,627	69.7	الريف
		<b>المحافظات</b>
4,442	74.6	العاصمة
645	74.8	البلقاء
1,645	71.0	الزرقاء
262	61.5	مادبا
1,993	79.2	اريد
460	71.7	المفرق
293	76.4	جرش
228	83.8	عجلون
378	75.4	الكرك
146	75.5	الطفيلة
164	70.6	معان
221	76.2	العقبة
		<b>الإقليم</b>
6,993	73.3	الوسط
2,975	78.1	الشمال
908	74.8	الجنوب
		<b>منطقة البادية</b>
823	65.2	البادية
10,053	75.5	غير البادية
		<b>المستوى التعليمي الذي تم الالتحاق به</b>
416	42.6	غير متعلمة
813	59.2	ابتدائي
1,681	68.5	إعدادي
4,788	76.9	ثانوي
3,179	83.0	أعلى من الثانوي
		<b>شرائح الرفاه</b>
2,211	65.7	الأدنى
2,296	73.4	الثاني
2,206	76.3	الوسط
2,135	76.7	الرابع
2,028	82.4	الأعلى
<b>10,876</b>	<b>74.7</b>	<b>المجموع</b>

ويبين الجدول 10.12 أن ثلاثة أرباع السيدات (75%) يعرفن عن الواقي الذكري ويستطعن تسمية أحد المصادر للحصول عليه. ومعرفة مصدر الواقي الذكري تتبع أنماطاً متوقعة حسب الخصائص الأساسية، باستثناء أن السيدات اللاتي يقمن في إقليم الشمال كن إلى حد ما أكثر معرفة بمصدر الواقي الذكري (78%) مقارنة مع إقليم الجنوب والوسط (75% و 73% على التوالي). وعلى أية حال، فإن معرفة مصدر الحصول على الواقي الذكري لا يبدو أنها تعني استعمال الواقي الذكري في الأردن. ويبين الجدول 11.12 أنه من بين السيدات اللاتي عاشرن أزواجهن خلال السنة الماضية فإن 6% فقط استعملن الواقي الذكري آخر مرة مارسن فيها الجنس مع أزواجهن أي بزيادة طفيفة في استعمال الواقي الذكري مقارنة بمسح السكان والصحة الأسرية 2002 (4%).

جدول 11.12 نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي مارسن الجنس خلال ال 12 شهراً السابقة واستعملن الواقي الذكري في آخر مرة مارسن الجنس فيها مع أزواجهن حسب الخصائص الأساسية، الأردن 2007

عدد السيدات	استعملن الواقي الذكري في آخر مرة مارسن الجنس فيها	الخصائص الأساسية
		<b>العمر</b>
1,478	6.4	24-15
236	3.9	19-15
1,241	6.9	24-20
1,924	6.2	29-25
4,065	6.7	39-30
2,779	3.9	49-40
		<b>مكان الإقامة</b>
8,709	6.0	الحضر
1,537	4.6	الريف
		<b>المحافظات</b>
4,186	5.3	العاصمة
614	5.5	البلقاء
1,544	7.4	الزرقاء
248	4.8	مادبا
1,870	6.4	اريد
436	4.2	المفرق
276	5.2	جرش
217	4.6	عجلون
359	7.3	الكرك
136	5.0	الطفيلة
150	4.4	معان
210	4.3	العقبة
		<b>الإقليم</b>
6,592	5.8	الوسط
2,799	5.8	الشمال
855	5.7	الجنوب
		<b>منطقة البادية</b>
776	3.5	البادية
9,470	6.0	غير البادية
		<b>المستوى التعليمي الذي تم الالتحاق به</b>
340	3.5	غير متعلمة
725	3.4	ابتدائي
1,566	4.2	إعدادي
4,557	5.2	ثانوي
3,059	8.3	أعلى من الثانوي
		<b>شرائح الرفاه</b>
2,049	4.2	الأدنى
2,180	5.7	الثاني
2,086	6.4	الوسط
2,006	6.1	الرابع
1,926	6.6	الأعلى
<b>10,246</b>	<b>5.8</b>	<b>المجموع</b>